

RECOMMANDATION POUR LES INJECTIONS DE PRODUITS RESORBABLES

Si vos pores sont dilatés sur le site à traiter, il est conseillé de réaliser un soin astringent : lotion astringente, masque nettoyant, préparation à base de vit A acide ou d'AHA (demandez conseil à votre médecin) .

Avant :

ne pas prendre d'anti-inflammatoires, aspirine ou anticoagulants (au moins 3 jours, si possible une semaine avant la séance d'injection).

Signaler tout changement de traitement récent.

Après :

Les effets secondaires sont rares et peu durables

Si douleur, prendre un calmant type paracétamol (Efferalgan, Doliprane) et masser la zone sensible avec une crème hydratante.

Si démangeaisons, le signaler à votre médecin et masser avec une crème dermocorticoïde en attendant.

Si rougeur, ce qui est assez fréquent, la masquer avec un produit de maquillage vert puis un produit de la teinte de votre peau (fond de teint par exemple). Il est possible que votre médecin vous applique, en fin de séance, une crème pour diminuer cette rougeur.

Crème anti-rougeurs : les crèmes anti-rougeurs permettent de récupérer plus vite votre teinte habituelle. Elles sont calmantes, agréables d'emploi et contiennent souvent un peu de pigment vert pour avoir un effet optique masquant en plus.

Froid : l'application de froid réduit les rougeurs et les gonflements dans les heures qui suivent l'injection; ne pas appliquer directement des glaçons, vous pourriez vous brûler la peau.

Si hématomes, les masquer en appliquant un produit de couleur jaune tant qu'ils sont violets; après quelques jours, leur couleur évolue vers le vert puis ils disparaissent.

Arnica : la prise d'Arnica juste avant et après la séance, ainsi que de crème à l'Arnica peut, dans certains cas, limiter les hématomes

Si nodules, les masser énergiquement et prévenir votre médecin. Si papules, attendre : disparition en quelques mois.

Pas de sauna, de hammam, de soins esthétiques autres, d'alcool le jour même.

Tous ces effets sont transitoires et leur persistance plus de 24 h doit vous inciter à contacter votre médecin pour accélérer leur disparition.

Maquillage possible pour masquer : vert sur rouge, jaune sur violet et fond de teint.

CAS PARTICULIERS :

Si injection des lèvres :

un œdème est fréquent lors de l'injection des lèvres. Il peut parfois durer 2 ou 3 jours. L'application de froid aide à le diminuer.

Si anesthésie :

éviter de boire et manger jusqu'à ce que vous ayez récupéré les sensations tactiles, sinon vous pouvez baver ou vous mordre.

Poussée d'herpès :

Elle peut être prévenu par la prise de traitement spécifique. Si la poussée est une surprise post injection, commencer le traitement le plus rapidement possible et prévenez votre médecin (Zelitrex).

Allergies :

très rares (1/10 000), se traduisent par un œdème, une induration au site d'injection. **Des lésions acnéiformes** ont été décrites.

Ces cas particuliers doivent faire l'objet de traitements spécifiques médicaux.

NE PAS HESITER A EN PARLER A VOTRE MEDECIN